

西藏野生食用菌资源研究

侯元同¹ 于胜祥¹ 张广杰²

(1 曲阜师大生物系, 273165; 2 中科院昆明植物所, 650204)

文章编号 1000-8357(2001)04-0002-02

野生食用菌生于自然界, 比栽培种具有更丰富的矿质营养, 并且不受药物的污染, 是一类有着广阔开发前途的自然资源。西部开发的一项重要内容就是野生自然资源的开发。为此, 我们对西藏的野生食用菌资源进行了研究, 结果表明, 西藏共有野生食用菌 94 种, 属于 12 个科, 49 个属。本文报道了部分野生食用菌所属的科, 以及在西藏的生态地理分布情况。

木耳 *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw., 分布八宿县、波密县和亚东县海拔 3200~3300m 云杉林下。

薄木耳 *Auricularia tenuis* Lowy., 分布隆子县三安曲林、波密县易贡海拔 2100m 林地倒木上。

银耳 *Tremella fuciformis* Berk., 分布察隅县下察隅林下枯木上。

虎掌菌 *Tremellodon gelatinosus* Fr., 分布米林县甲格、察隅县下察隅林下。

红喇叭菌 *Cantharellus cinnabarinus* Schwein., 分布米林县巴嘎北坡竹林下。

喇叭菌 *Cantharellus floccosus* Schw., 分布亚东县阿桑桥海拔 2700m 林下。

玉髯 *Hericium coralloides* (Scop. ex Fr.) Pers. ex Gray., 分布波密县、墨脱公路和米林县海拔 3100~3200m 林下倒、腐木上。

灰树花 *Polyporus frondosus* (Dicks.) Fr., 分布波密县、林芝县和聂拉木县等海拔 2800m 云、冷杉林下。

虎皮假牛肝菌 *Boletinus pictus* (Peck.) Peck., 分布洛札县拉康区海拔 3300m 林中地。

细点牛肝菌 *Boletus pulverulentus* Opat., 分布亚东县阿桑桥海拔 2700m 林中地。

褐环粘盖牛肝菌 *Stellus luteus* (L. ex Fr.) Gray., 分布米林县海拔 3000m 林中地。

松塔牛肝菌 *Strobilomyces floccopus* (Vahl. ex Fr.) Karst., 分布聂拉木县海拔 3500m 林中地。

玫瑰红铆钉菇 *Gomphidius roseus* Fr., 分布米林县巴嘎林下。

灰白乳菇 *Lactarius pallidus* (Pers. ex Fr.) Fr., 分布米林县和隆子县加玉、准巴灌丛下。

水液乳菇 *Lactarius serifluus* (De.) Fr., 分布聂拉

木县和波密县海拔 2400~3000m 林地。

粘柄乳菇 *Lactarius thyrinos* A. H. Smith., 分布林芝县色齐拉山海拔 3900m 云杉林下。

铜绿菇 *Russula aeruginea* Lindb. ex Fr., 分布洛札县拉康海拔 3300m 林中地。

花盖菇 *Russula cyanoxanthus* (Schaeff.) Fr., 分布吉隆县、聂拉木县、波密县札木林场、米林县巴嘎和亚东县阿桑桥等海拔 2440~3000m 的林下。

美味红菇 *Russula delica* Fr., 分布吉隆县托丹、波密县札木林场和亚东县伐木场等海拔 3000~3300m 林地。

黄菇 *Russula lutea* (Huds.) Fr., 分布米林县。

罗梅尔红菇 *Russula romellii* Maire., 分布波密县札木林场海拔 3000m 林地。

粉红菇 *Russula subdepallens* Pk., 分布米林县甲格、巴嘎、察隅县等林下。

绿菇 *Russula virescens* (Schaeff.) Fr., 分布米林县巴嘎林下。

侧耳 *Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quel., 分布八宿县然乌、察隅县吉公云杉林下倒木、腐木上。

黄环菌 *Armillaria luteo-virens* (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc., 分布亚东县帕里海拔 4300m 草地。

松苞菇 *Calathelasma ventricosum* (Peck.) Sing., 分布近云南境。

卷边杯菌 *Clitocybe inversa* (Scop. ex Fr.) Quel., 白蘑科, 分布米林县 3000m 林地。

冬菇 *Flammulina velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing., 分布亚东县卓松布林下、隆子县准巴河谷林下树干上、林芝县东久林下枯木上。

棘孢蜡蘑 *Laccaria tortilis* (Bolt. ex Fr.) Pat., 分布亚东县卓松布察隅县札拉松林下。

角孢离褶伞 *Lyophyllum trigonosporum* (Bres.) Sing., 分布察隅县札拉海拔 2000m 云杉林下。

蜜褶皮菌 *Marasmius dryophilus* (Bull. ex Fr.) Karst., 分布亚东县、隆子县、米林县林下落叶层。

黑白毡菌 *Melanoleuca melaleuca* (Pers. ex Fr.) Murr., 分布昌都、类乌齐县海拔 4200m 林地。

鳞皮蘑 *Tricholoma imbricatum* (Fr.) Quel., 分布芒康县、昌都、类乌齐县海拔 3200~4100m 林下土。

橙盖伞 *Amanita caesarea* (Scop. et Fr.) Pers., 分布亚东县阿桑桥海拔 2700m 林地。

赭盖鹅膏 *Amanita rubescens* Pers. ex Gray., 分布米林县巴嘎海拔 3000m 林地落叶上。

裂皮白伞菇 *Leucogarricus excoriatus* (Schaeff. ex Fr.) Singer., 分布察隅县下察隅、吉隆县海拔 3100m 林缘草地及林中落叶层。

