



3 蜂斗草

4 展毛野牡丹

5 莲座叶紫金牛

6 虎舌红

7 罗伞树

培。花期4—6月。

野牡丹科植物中,很多都是木本观赏植物。花型大,盛开花的直径4—10厘米,花紫红、粉红或血红色。多数分布在浅山丘陵地上。主要有野牡丹 (*Melastoma candidum*)、毛稔 (*M. sanguineum*)、紫毛野牡丹 (*M. penicillatum*), 4—6月开花。细叶野牡丹 (*M. intermedium*) 分布在近海台地上,7—9月开花,玫瑰红色。野牡丹科供作观花、观叶的还有异形木 (*Allomorphia balansae*)、海南偏偏花 (*Plagiopetalum hainanense*)、桑叶草 (*Sonerila cantonensis*) 和卷花丹 (*Scorpiothyrus xanthostictus*)等。

紫金牛科植物海南有十余种,供观赏或药用。广布种有雪下红 (*Ardisia villosa*), 海

拔750—1300米的密林中常见有郎伞木 (*A. elegans*)、虎舌红 (*A. mamillata*)、罗伞树 (*A. quinquegona*)、莲座紫金牛 (*A. primulaefolia*)。在滨海台地至海拔500米的疏林、灌丛中有耐旱、耐脊薄的多脉紫金牛 (*A. nervosa*)、短柄紫金牛 (*A. silvestris*)、矮紫金牛 (*A. humilis*)、粗脉紫金牛 (*A. crassinervosa*)等。



8 美丽紫金牛

优质薪炭材——黑心树

铁刀木 (*Cassia siamea*) 系云实科落叶乔木,高可达20米。傣语埋西哩。人们从砍伐后直径约1米的树梢看到:圆木的周围有2厘米厚的金黄色边材,其余部分均系黑红色。故当地人称它黑心树。

黑心树分布于印度、缅甸、泰国、西双版纳州内普遍栽培。该树无论是种在湿热或干热地区,都具有抗病虫害、速生的特点。一般情况下,播种后五年高可达15米、直径在25厘米以上。在树干的胸高部位处砍断,树桩就会萌生出几十根枝条,以后隔三年砍伐一次,每树可取

柴200—300公斤,一户人均4棵树就可解决烧柴问题。真可谓“取之不尽,用之不竭”。

是啊!每当向傣寨走去就可在道路旁、寨子边以及邻近的山坡上看到,那一棵棵、一片片、一行行的黑心树,它们灰白的树桩、嫩嫩的枝条、绿油油的叶片,簇拥着,挤得几乎连雨点也难以透过,到七、八月份枝端绽开一束束金黄色的花朵,每株黑心树仿佛是一只火把,火烧得满山遍野。

黑心树材质好,燃烧慢,火力强,烟雾小,不炸火星,是傣家人喜欢的薪炭材,要不傣族群众自古以来,身居林海柴满山却不用,偏偏喜爱埋西哩。

(中科院昆明植物所 申义祥)