苦绳的一个新甾体成分

沈小玲* 木全章

(中国科学院昆明植物研究所, 昆明)

摘要 从苦绳 (*Dregea sinensis* Hemsl.) 中分出一新的甾体成分, Dresigenin A (I), 经化学反应及光谱分析证明其结构为12-O-乙酰基-20-O-(2-甲基丁酰基)二氢肉珊瑚甾元 [12-O-acetyl-20-O-(2-methylbutyryl) dihydrosarcostin]。

关键词 苦绳; Dresigenin A

苦绳 (*Dregea sinensis* Hemsl.) 为萝藦科南山藤属植物, 药理检验有抗癫痫作用。从该植物中分出一新甾体甙元dresigenin A (I), 结构鉴定为12-O-乙酰基-20-O-(2-甲基丁酰基)二氢肉珊瑚甾元[12-O-acetyl-20-O-(2-methylbutyryl) dihydrosarcostin]。

I 在丙酮中结晶得无色棒状晶体, mp 250—252℃, $[\alpha]_D^{25} + 7.87$ (C=0.5, CH₃OH); 对醋酐-浓硫酸呈阳性反应; 据元素分析和质谱定出分子式为 C₂₈H₄₆O₈ (M⁺ 510)。

I 在5%的KOH/MeOH中水解得到二氢肉珊瑚甾元 (dihydrosarcostin) (II) [1]。在I的¹³C NMR, δ 175.78和171.65二峰说明分子中有二酯基存在; MS m/z 43 (CH₃CO⁺), 85 (C₄H₉CO⁺), 408 (M⁺-C₄H₉COOH), 450 (M⁺-CH₃COOH) 说明二酯基为CH₃CO及C₄H₉CO; m/z 381 (M⁺-CH₃CH-OCOC₄H₉) 则说明C₄H₉CO是与II的20-O相连; 在¹H NMR中(CDCl₃), δ 2.02的信号进一步证明了CH₃CO存在; δ 0.95 (t, J = 7Hz), 1.16 (d, J = 6.5 Hz) 的二甲基信号与2-甲基丁酸比较说明C₄H₉CO应为CH₃CH₂CH(CH₃)CO[2]; δ 4.60 (1H, dd, J = 10, 5 Hz), 4.68 (1H, q, J = 6Hz) 说明二酯基与II的12-O, 20-O相连接。

- I. Dresigenin A. R' = CH₃-C(=O)-
R'' = CH₃CH₂CH(CH₃)-C(=O)-
II. R' = H, R'' = CH₃CH₂CH(CH₃)-C(=O)-
III. R' = H, R'' = H

I 在4%的K₂CO₃/H₂O + MeOH中水解得一部分皂化产物 I, 其¹H NMR与 I 比较,

δ 2.2信号消失; MS中 m/z 450、43的峰消失, 表明水解去掉了乙酰基; 同时 MS 中出现 m/z 339 ($M^+ - CH_3\overset{|}{C}H - OCOC_4H_9$) 的信号峰, 又一次说明了 $CH_3CH_2CH(CH_3)CO$ 与 20-O 相连接; 在 I 的 1H NMR 中, 12α -H 信号由原来的 4.60 ppm 向高场移动到 3.44 ppm, 说明 I 中 CH_3CO 连在 12-O 上, 确证 $CH_3CH_2CH(CH_3)CO$ 连在 20-O 上。I 的结构为 20-O-(2-methylbutyryl) dihydrosarcostin。由于去掉了 CH_3CO 对 20-H 的屏蔽作用, 20-H 的信号由 δ 4.68 向低场移动到 δ 5.22, 这一结果与已知物 20-O-(2-methylbutyryl) sarcostin 的 12α -H (δ 3.48, dd, $J = 10.4$ Hz), 20-H (δ 5.20, q, $J = 6$ Hz) 结果一致^[3]。

表 1 Dresigenin A 的 ^{13}C 核磁共振谱化学位移 (C_5D_5N)
Table 1 The chemical shift of ^{13}C NMR spectra of Dresigenin A

C	I	II	III	C	I	II	III
1	38.79	38.95	37.89	15	33.43	33.87	33.35
2	31.86	32.02	31.10	16	33.43	33.79	33.35
3	70.80	70.81	70.16	17	88.46	88.44	88.57
4	38.21	38.48	37.67	18	11.44	10.67	10.44
5	45.77	45.88	45.37	19	13.14	13.30	12.70
6	24.60	25.44	24.70	20	76.19	76.29	72.04
7	34.43	34.71	34.10	21	16.49	17.06	16.83
8	75.14	75.03	75.05	1'	171.65		IIa)
9	46.94	47.56	46.69	2'	22.16		
10	36.48	36.50	35.60	1''	175.78	175.43	178.3
11	26.52	29.11	27.50	2''	41.70	41.68	41.4
12	74.13	70.90	70.91	3''	25.25	26.69	27.2
13	57.12	59.02	58.52	4''	11.88	11.85	11.9
14	87.67	88.30	88.19	5''	15.39	15.37	17.1

a) 2-甲基丁酸数据选自文献记载。

实 验 部 分

熔点测定用显微熔点测定仪 (温度计未校正)。比旋度用 J-20C 型旋光光谱仪测定。红外光谱用 P-E 577 仪测定。核磁共振谱用 WH-90 型核磁共振仪测定。质谱用 Finnigan 4510 型质谱仪测定。柱层析和薄层层析用硅胶为青岛海洋化工厂出品。

提取 苦绳 (*Dregea sinensis* Hemsl.) 样品采自云南迪庆州。其根粉 6.5 kg 用工业乙酸乙酯提取三次, 每次用量 10 升, 合并提取液, 减压回收溶剂后得棕色乙酸乙酯提取物 350 g, 先后用石油醚, CCl_4 回流脱脂三次后得到粗甙 243 g。

I 的分离 粗甙 65 g, 用 300 g 硅胶吸附, 1200 g 硅胶装柱, 依次用 95:5, 9:1,

85:15, 8:2 的石油醚:丙酮洗脱。在85:15的洗脱液中得一无色晶体,薄板层析检查为单一斑点,重2.5 g,定名为dresigenin A (I)。

I 的结构鉴定 I 在丙酮中重结晶得无色棒状晶体, mp 250—252°C, $[\alpha]_D^{25} + 7.87$ (C=0.5, CH₃OH); 元素分析 C₂₈H₄₆O₈, 计算值(%): C 66.06, H 9.26; 分析值(%): C 66.12, H 9.27; IR ν_{max} cm⁻¹: 3530, 3470, 3400(OH), 2970, 2925, 2850(C-H), 1725, 1710(C=O), 1250, 1240, 1050; MS m/z: 511 (M+H), 493 (M+H-H₂O), 474 (M⁺-2H₂O), 450 (M⁺-CH₃COOH), 432 (M⁺-CH₃COOH-H₂O), 408 (M⁺-C₄H₉COOH), 381 (M⁺-CH₃CH-O-CO-C₄H₉), 85 (C₄H₉CO⁺), 43 (CH₃CO⁺); ¹H NMR (CDCl₃) δ : 4.68 (1H, q, J=6Hz, 20-H), 4.60 (1H, dd, J=10, 5 Hz, 12 α -H), 3.61 (1H, m, 3 α -H), 2.02 (3H, s, 2'-CH₃), 1.90 (3H, s, 18-CH₃), 1.40 (3H, s, 19-CH₃), 1.16 (6H, d, J=7 Hz, 21-CH₃, 5''-CH₃), 0.95 (3H, t, J=7Hz, 4''-CH₃)。2-甲基丁酸的¹H NMR(CDCl₃) δ : 0.95 (3H, t, J=7Hz, 4-CH₃), 1.18 (3H, d, J=7Hz, 5-CH₃)。

I 的部分皂化 I 500 mg用50 ml CH₃OH溶解,加入8%的K₂CO₃/H₂O 50ml,水浴回流1小时,加入两倍量水,减压抽尽CH₃OH,反应液用乙酸乙酯充分抽提,得400 mg粗提物,经硅胶柱层析,用CHCl₃:CH₃OH 97:3, 95:5洗脱,在97:3洗脱液中得纯品II 50 mg,在95:5洗脱液中得纯品III 20 mg。II、III得率比2:1。

II 在CHCl₃中重结晶得白色针状晶体, mp 207—208°C, $[\alpha]_D^{25} + 17.82$ (C=0.502, CH₃OH); 据MS和¹³C NMR确定分子式为C₂₈H₄₄O₇ (M⁺ 468); IR: ν_{max} cm⁻¹ (KBr): 3450 (OH), 2960, 2915, 2882 (C-H), 1710 (C=O); MS m/z: 468 (M⁺), 450 (M⁺-H₂O), 432 (M⁺-2H₂O), 366 (M⁺-C₄H₉COOH), 339 (M⁺-CH₃CH-OCOC₄H₉), 85 (C₄H₉CO⁺); ¹H NMR δ (CDCl₃): 5.22 (1H, q, J=6Hz, 20-H), 3.60 (1H, m, 3 α -H), 3.44 (1H, dd, J=10, 5Hz, 12 α -H), 1.87 (3H, s, 18-CH₃), 1.31 (3H, s, 19-CH₃), 1.21 (3H, d, J=7Hz, 21-CH₃), 1.15 (3H, d, J=7Hz, 5'-CH₃), 0.87 (3H, t, J=7Hz, 4'-CH₃)。

I 的全皂化 I 150 mg用20 ml CH₃OH溶解,加入10%的KOH/MeOH 20 ml,水浴回流12小时,加入等量水,减压抽尽CH₃OH,用乙酸乙酯充分抽提,提取物上硅胶柱,用95:5的CHCl₃:CH₃OH洗脱,得纯品III 80 mg。

III 在CH₃OH中重结晶,得无色透明方形晶体, mp 242—244°C, $[\alpha]_D^{25} + 32.04$ (C=0.554, CH₃OH); 元素分析C₂₇H₃₈O₈, 计算值(%): C 65.62, H 9.44; 分析值(%): C 65.13, H 9.60; MS中M⁺ 384; IR无C=O吸收; ¹H NMR(C₆D₆N) δ : 4.46 (1H, q, J=6Hz, 20-H), 3.95 (1H, dd, J=10, 5 Hz, 12 α -H), 3.84 (1H, m, 3 α -H), 1.96 (3H, s, 18-CH₃), 1.51 (3H, d, J=7Hz, 21-CH₃), 1.28 (3H, s, 19-CH₃)。熔点及光谱数据与5 α -二氢肉珊瑚

式元完全吻合。

致谢 本所物理仪器组帮助作光谱, 陆健荣作了部分工作。

参 考 文 献

- 1 Schaub F, Kanfmann H, Stocklin W et al. *Helv Chim Acta* 1968, 51 (4—6): 738—757
- 2 Higuchi R, Komori T, Kawasaki T et al. *Phytochemistry* 1983, 22(5): 1235—1237
- 3 Terada S, Mitsuhashi H. *Chem Pharm Bull* 1979, 27(10): 2304—2309

A NEW STEROIDAL COMPOUND OF DREGEA SINENSIS

Shen Xiaoling, Mu Quanzhang

(*Kunming Institute of Botany, Academia Sinica, Kunming*)

Abstract A new steroidal compound, Dresigenin A, was isolated from the root of *Dregea sinensis* Hemsl. On the basis of mild saponification with 4% $K_2CO_3/H_2O + MeOH$ and spectral studies, its chemical structure was elucidated as 12-O-acetyl-20-O-(2-methylbutyryl) dihydrosarcostin.

Key words *Dregea sinensis*, Dresigenin A

野迎春叶的单萜裂环烯醚甙研究

贺震旦 杨崇仁

(中国科学院昆明植物研究所, 昆明)

摘要 从野迎春 (*Jasminum mesnyi* Hance) 鲜叶中分得三个单萜裂环烯醚甙类成分迎春花素 (jasminin)、迎春花甙 (jasmoside) 和野迎春叶甙 (jasmisnyiroside); 其中野迎春叶甙为一新化合物。

关键词 迎春花; 单萜裂环烯醚甙; 野迎春叶甙; 迎春花素; 迎春花甙

野迎春 (*Jasminum mesnyi* Hance), 又名迎春柳、金铃花、云南黄素馨等, 为木樨科素馨属植物。分布于云南、贵州和四川的山坡灌丛中。现广为种植, 供观赏。全株入药, 可清热消炎解毒, 治疗支气管炎, 腮腺炎, 牙痛等, 花用于解热利尿, 叶治肿毒恶疮和跌打损伤, 鲜叶还可灭杀蚊蝇的幼虫^[1]。野迎春与迎春花 (*J. nudiflorum* Lindl.) 十分相似, 二者均广泛种植, 在许多文献中常将这两种植物混淆。但野迎春为常绿灌木, 小叶片较大 (长 3—5 cm, 宽 1—2 cm), 花冠管较长, 一般仅栽培于长江以南地区^[2]。我们从野迎春鲜叶中分得一个新的单萜裂环烯醚甙成分野迎春叶甙 (jasmisnyiroside) (1), 以及已知的迎春花素 (jasminin) (2)、迎春花甙 (jasmoside) (3)。本文报告野迎春花叶甙的化学结构。

野迎春鲜叶的甲醇提取物, 经大孔吸附树脂柱层析分离。50% 甲醇洗脱部分再经硅胶柱层析和反相柱层析反复分离纯化得到化合物 (1)、(2) 和 (3)。甲醇洗脱部分经柱层析分离亦得到化合物 (2)。(2) 和 (3) 经光谱测定并与已知标准品对照, 分别证明为迎春花素 (jasminin) 和迎春花甙 (jasmoside)。

野迎春叶甙 (jasmisnyiroside) (1) 为白色针状结晶, mp 230—232°C, $[\alpha]_D^{25} - 228.21$ (C = 0.39, MeOH), 按元素分析分子式为 $C_{28}H_{38}O_{14}$ 。(1) 的 ^{13}C 和 1H 核磁共振谱与 (2) 相比较表明二者甙元和糖基部分的结构均相一致 (见表 1、2), 仅甙元酯基的结构有较明显的差异。与 (2) 相比较, (1) 的 ^{13}C NMR 谱少了 δ 52.3 和 δ 67.6 两个讯号, 然而却在 δ 91.9 和 δ 180.5 多出两个碳的讯号, 在偏共振去偶谱中, 二者均为单峰。 δ 180.5 为羧基的讯号, 由于碳 10" 位上 $-CH_2OH$ 讯号消失, 且碳 8"、9" 位讯号向高磁场位移, 显然该羧基应连接在碳 10" 上; δ 91.9 应为连接有含氧基团的碳, 其位置可能在 1"、2"、3"、5" 或者 8" 位上。在 (2) 中, 7" 位上的两质子, 由于受到 1" 位质子的偶合以及自身异氢偶合作用, 分别为双二重峰, 而 (1) 的 7" 位两质子仅分别为偶合常数 $J = 11.0$ Hz 的二重峰 δ 4.68 (d) 和 δ 4.03 (d),