

## 羽藓属一新种

曾淑英

(中国科学院昆明植物研究所)

### A NEW SPECIES OF THE THUIDIUM FROM XIZANG (Tibet)

Zeng, Shu Ying

(Kunming Institute of Botany, Academia Sinica)

**关键词:** 噬蚀叶羽藓

**Key word:** *Thuidium erosifolium*

#### 噬蚀叶羽藓 新种 图 1

植物体极纤细，柔软，疏松交织生长，上部金黄色，下部淡褐黄色。茎匍匐，长约1.5—3 cm，直径0.15 mm，不规则二回羽状分枝，具黄棕色假根和线状或披针形鳞毛。茎叶疏松排列，微凹，干时尖部内弯，潮湿时直立开展或顶端外倾，阔卵圆形或三角状卵圆形，先端渐尖，由1—3个单列细胞组成毛状尖，叶边缘具不规则粗齿，齿顶端平滑或具2—3个疣，从中部到基部背卷；中肋较透明，其长度为叶的 $2/3$ ，背部上面具2—3刺状疣，叶中部细胞为不规则4—5边形，稀六边形，具单疣，基部细胞长方形或长4—5边形，平滑或具疣。枝叶凹，卵圆形或长圆状卵圆形，先端短渐尖，干时内曲，潮湿时倾立，中肋延伸至叶的 $2/3$ 处，背部上面具2—3刺状疣，下部具微疣；细胞不规则的4—6边形，稀长方形。雌雄同株异苞。雌苞叶卵披针形，先端无纤毛，边缘从中部到顶端具齿，下部平滑。

**西藏:** 林芝县，海拔2050m，生于林中树干基部，1982年11月21日，苏永革2362〔模式标本存昆明植物研究所标本室(HKAS)〕。

新种与 *Thuidium lejeuneoides* Nog. 相近，但叶边缘具不规则粗齿，中肋背面具2—3刺状疣，叶中部细胞为不规则的4—5边形，稀六边形，雌苞叶先端无纤毛可区别。

#### *Thuidium erosifolium* Zeng, sp. nov.

Plantae gracillimae, molles, inter se laxe intricatae, superne aureae, inferne fusculo-flavae. Caulis repens ca. 1.5—3 cm longus, 0.15 mm crassus, irregulatim 2-pinnatus ramosus, rhizoideis fulvis et paraphylliis filiformibus vel lanceolatis. Folia caulinum laxa, leviter concava, in siccitate apice inflexa, in uido erecto-patentia vel apice recurva, late ovata vel triangulo-ovata, apice acuminata, apicibus 1-3-cellulis unifariis constitutis, margine grosse erosa, a mediis usque ad bases recurva, dentibus apice laevibus vel 2-3-papillosum, costis pellucidioribus longitudine 2/3 foliorum partes aequantibus, costis dorsorum superne 2-3-spinoso-papillosum, cellulis medium foliorum irregulariter 4—5-angulatis, raro hexagonis, papillatis, basium

本文承黎兴江教授审阅全文，苏志云副教授审阅拉丁文，在此深表感谢。

rectangularibus vel longe 4—6-angulatis, laevibus vel papillatis. Folia ramorum concava, in sicco inflexa, in uido erecto-patentia, ovata vel oblongo-ovata, apice breviter acuminata, costis ad 2/3 productis, costis dorsorum superne 2—3-spinoso-papilloso inferne tenuiter papilloso cellulis irregulariter 4—6-agulatis, raro rectangularibus. Autoica. Bracteae perichaetiales apice eciliatae, margine a medio ad apicem denticulatae, inferne laeves.

Species nova affinis *Thuidio lejeuneoides* Nog. sed foliis margine grosse erosis, costis dorsalibus superne 2—3-spinoso papilloso, cellulis mediorum foliorum irregulariter 4—5-agulatis, raro hexagonis, bracteis perichaetialibus apice eciliatis differt.

**Xizang:** Lyingchi Xian (Lin'e'h County), alt. 2050m, growing on base of trunk in forest, 21. XI. 1982, Su Yong-ge 2362 [Type in Herb. Kunming Inst. Bot. Acad. Sin conservator (HKAS)].




图1 噬蚀叶羽藓 *Thuidium erosifolium* Zeng sp. nov.

1. 植株 ( $\times 7$ )；2. 支的一部份 ( $\times 33$ )；3. 雌苞叶 ( $\times 100$ )；4. 茎叶 ( $\times 100$ )；
- 5—6. 枝叶 ( $\times 100$ )；7—8. 小羽枝叶 ( $\times 100$ )；10—11. 茎叶尖部细胞 ( $\times 413$ )；
12. 茎叶中部细胞 ( $\times 413$ )；13. 茎叶基部细胞 ( $\times 413$ )；14. 枝叶尖部细胞 ( $\times 413$ )；
15. 枝叶中部细胞 ( $\times 413$ )；16. 枝叶基部细胞；17—22. 翅毛 ( $\times 413$ )。